

Outros problemas causados pelo cigarro

- Síndrome da Morte Súbita Infantil (SMSI): acontece enquanto os bebês dormem durante à noite ou estão cochilando durante o dia, antes de completar os seus quatro meses de vida. Não se sabe exatamente a causa da morte do bebê. As pesquisas apontam para diversos fatores como irregularidade no batimento cardíaco, distúrbio metabólico, posição de braços para dormir. A inalação da fumaça de cigarro contribui com as chances do bebê ser vítima de SMSI.
- O fumo exerce um efeito negativo nos dentes: diminui a resposta cicatricial (processo de cicatrização) e também acelera a destruição periodontal (gengiva ao redor do dente).
- O cigarro pode ocasionar incêndios acidentais e normalmente encontram-se associados ao consumo de álcool.

Elaboração

Equipe de Saúde da Criança do Centro de Saúde-Escola "Prof. Samuel B. Pessoa"

Departamento de Pediatria – FMUSP

Dra Erica Edamatu

Dra Jaqueline L. Sgroi

Dra Maria Aparecida F. Aranha

Dra Paulette C. Douek

Dra Vera D'Ávila

Dra Viviane Mandarinino Terra

Enfermeira Reneide R. Ramos


Psicóloga Raquel Diaz Degenszajn

Referências bibliográficas:

- Sociedade Brasileira de Pediatria
- Ministério da Saúde – Brasil
- Instituto Nacional do Câncer. Coordenação Nacional de Controle de Tabagismo e Prevenção Primária.



O FUMO, A GESTANTE E O BEBÊ



FUMO E O BEBÊ

- A nicotina também está presente no leite materno de mães fumantes.



- Nesses casos, após cada mamada, o bebê poderá apresentar agitação, choro, vômito e até mesmo alterações de seu ritmo cardíaco

POLUIÇÃO AMBIENTAL

- Crianças que ficam expostas continuamente às substâncias tóxicas do tabaco nos domicílios em que pais e outros familiares fumam podem ter inalado o equivalente à fumaça de um ou mais cigarros ao final do dia.

FUMO E GRAVIDEZ

- Fumar durante a gravidez traz sérios riscos para a gestante como também aumenta o risco de mortalidade fetal e infantil, tais como:
 - ✓ abortamentos espontâneos
 - ✓ mortes fetais e de recém-nascidos
 - ✓ gravidez tubária
 - ✓ placenta prévia
 - ✓ deslocamento prematuro da placenta
 - ✓ episódios de sangramento
- A gestante fumante apresenta mais complicações durante o parto e têm o dobro de chances de ter um bebê de menor peso e menor comprimento quando comparada à gestante que não fuma.



O QUE É A FUMAÇA DO CIGARRO?

- A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas diferentes que atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos e contém mais de 60 cancerígenos.

O QUE É FUMANTE PASSIVO?

- É o indivíduo que convive com fumantes e respira a fumaça de derivados do tabaco em ambientes fechados. Pesquisas mostram que o tabagismo passivo é estimado como a 3ª maior causa de morte evitável no mundo, só perdendo para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool.

CONSEQUÊNCIAS PARA A CRIANÇA

- A criança exposta continuamente a um ambiente de fumantes, pode sofrer consequências por toda a sua vida, tais como:
 - ✓ menor estatura
 - ✓ retardo no desenvolvimento mental
 - ✓ maior ocorrência de doenças respiratórias (pneumonia, bronquites, tosse e outros)
 - ✓ agravamento de processos alérgicos (rinites, chiado no peito, crises asmáticas), diminuição da capacidade pulmonar

